

2.5.3

Depressioni in substrati torbosi del *Rhynchosporion*

Torfmoor-Schlenken
(*Rhynchosporion*)

Depressions on peat substrates of
the *Rhynchosporion*

Codici habitat:

Natura 2000: 7150

Corine: 54.6

EUNIS: D2.3H1

Inquadramento generale

Tipo di habitat molto raro e di rilevante valore biogeografico. In linea generale è quasi sempre collegato a 7140 e poiché occupa solo modeste depressioni all'interno di aree torbose, la sua superficie non è stata cartografata. Esso è caratterizzato da comunità di specie vascolari rare e minacciate, da sfagni ed altre briofite, in ambiente oligotrofico, in cui si osserva ancora un sottile strato di acqua libera (o di melma nei periodi più secchi). Per l'arco alpino tale habitat meriterebbe la qualifica di prioritario.

Interpretazione della variabilità, dei potenziali sottotipi e distribuzione dell'habitat

riconoscibili per la presenza dominante

Il tipo comprende le comunità dell'alleanza *Rhynchosporion albae*, molto ben della specie guida o di *Carex limosa*.

Località caratteristiche

Biotopo Torbiera di Rasun, Biotopo Torbiera Totes Moos, Biotopo Torbiera Wölfl.

Dinamismo naturale

Si tratta, come per tutte le depressioni, di situazioni destinate ad essere superate con il progressivo interrimento dovuto ai fenomeni naturali di degradazione delle spoglie vegetali e al lavoro degli sfagni. Le dinamiche evolutive sono complesse ed una delle possibilità è l'affermazione di torbiere alte, ombrotrofiche, a sfagni e pino mugo, come stadi durevoli. Un'altra possibilità è l'affermazione di cariceti a *Carex lasiocarpa* o a *Carex rostrata*, stadi temporanei. Sotto il limite potenziale del bosco anche la torbiera boscosa con pino silvestre ed abete rosso può rappresentare uno stadio evolutivo durevole. Ovviamente va considerato che queste comunità possono trovare nuovi spazi da colonizzare in ambienti lacustri e paludosi ancora meno vegetati (3160).



Fig. 45:
Parco Naturale
Monte Corno,
Lago Bianco

Specie tipiche

dominanti: *Carex limosa*, *Rhynchospora alba* (!).

caratteristiche: *Drosera anglica* (!), *Drosera intermedia* (!), *Drosera x abovata* (!)
Lycopodiella inundata (!), *Rhynchospora fusca* (!).

altre: *Carex canescens*, *Carex lasiocarpa* (!), *Carex nigra*, *Carex rostrata*, *Drepanocladus exannulatus*, *Drosera rotundifolia* (!), *Eriophorum angustifolium*, *Menyanthes trifoliata*, *Scheuchzeria palustris* (!), *Sphagnum* spp..

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura

Ambienti poco estesi, estremamente vulnerabili, sensibili a qualsiasi intervento diretto o indiretto che modifichi il livello della falda o comporti alterazioni del chimismo naturale. Nel caso si rendessero necessari interventi di minuta manutenzione, sia pure per accedere ad altri siti, si dovrebbe evitare accuratamente di interessare le depressioni. In sede di pianificazione e gestione va escluso qualsiasi intervento potenzialmente in grado di favorire fenomeni di eutrofizzazione.



Fig. 46:
Lycopodiella
inundata