

2.5.6

Torbiere basse alcaline

Kalkreiche Niedermoore

Alkaline fens

Codici habitat:

Natura 2000: 7230

Corine: 54.2

EUNIS: D4.1

Inquadramento generale

Habitat relativamente diffuso negli ambienti montani sui substrati carbonatici ma spesso solo in modo molto frammentario e certamente penalizzato dalle tradizionali forme di utilizzazione del suolo. Zone subpianeggianti o su lieve pendio, con acque superficiali di ruscellamento, sono popolate da numerose specie torbicole basifile, a stretto contatto sia con i pascoli calcarei (6170) che con le torbiere di transizione (7140), oppure anche in prossimità di ambienti sorgentizi. Si tratta di formazioni erbose con carichi di modesta taglia e un tappeto di briofite sempre ben sviluppato.

Interpretazione della variabilità, dei potenziali sottotipi e distribuzione dell'habitat

In questo habitat si possono comprendere tutte le comunità vegetali appartenenti all'alleanza *Caricion davallianae*. PEER, nella sua sintesi vegetazionale allegata alla cartografia, cita oltre al *Caricetum davallianae* s.str. anche il *Primulo-Schoenetum ferruginei*, capace di tollerare anche un periodo di relativa aridità estiva. A causa della superficie molto ridotta che occupano non sono citate altre associazioni presenti in provincia quali *Eleocharitetum pauciflorae* (piccole aree sorgentifere, con poca vegetazione, all'interno di torbiere) e *Caricetum frigidae* (margini di ruscelli e sorgenti, in prossimità di stillicidi). Per le caratteristiche complessive dell'habitat e per la presenza di numerose caratteristiche e differenziali, si tratta di un tipo di comunità facilmente riconoscibile.

Località caratteristiche

Alpe di Villandro, Prati di Armentara e nei Parchi naturali Dolomiti di Sesto, Fanes-Senes-Braies e Puez Odle.

Dinamismo naturale

Tutte le aree umide sono destinate ad avere una durata limitata nel tempo, ma se il ruscellamento si mantiene costante e non intervengono fattori di disturbo, alcune associazioni possono essere considerate relativamente stabili e quindi lungamente durevoli. Lo scorrimento dell'acqua, con l'azione di dilavamen-



Fig. 51:
*Parco Naturale
Monte Corno,
Lago Bianco*

to, impedisce ulteriori evoluzioni del suolo e contribuisce anzi al suo ringiovanimento. La diminuzione della portata e l'azione del pascolo possono tuttavia modificare l'assetto dei parametri ecologici e favorire l'ingresso e la successiva affermazione di specie meno igrofile.

Specie tipiche

dominanti: *Carex davalliana*, *Carex frigida*, *Schoenus ferrugineus* (!), *Schoenus nigricans* (!), *Trichophorum cespitosum*.

caratteristiche: *Carex capitata* (!), *Carex dioica*, *Carex pulicaris* (!), *Dactylorhiza incarnata* (!), *Dactylorhiza traunsteineri* (!), *Eleocharis quinqueflora*, *Epipactis palustris* (!), *Eriophorum latifolium*, *Liparis loeselii* (!), *Swertia perennis* (!), *Trichophorum alpinum*.



Fig. 52:
Carex davalliana
ed *Eriophorum*
latifolium

altre: *Agrostis stolonifera*, *Allium schoenoprasum*, *Aster bellidiastrum*, *Bartsia alpina*, *Blysmus compressus*, *Carex flava*, *Carex hostiana*, *Carex lepidocarpa*, *Carex panicea*, *Dactylorhiza cruenta* (!), *Dactylorhiza majalis*, *Eleocharis uniglumis* (!), *Equisetum palustre*, *Equisetum variegatum*, *Festuca trichophylla* (!), *Hierochloë odorata* agg. (!), *Juncus alpinoarticulatus*, *Molinia caerulea*, *Parnassia palustris*, *Pinguicula vulgaris*, *Potentilla erecta*, *Primula farinosa*, *Salix repens* subsp. *rosmarinifolia* (!), *Sesleria caerulea*, *Tofieldia calyculata*, *Triglochin palustris*, *Valeriana dioica*. Importante la componente briofitica.

Utilizzazioni, vulnerabilità, cura

Come tutti gli ambienti umidi, sono fragili e assai vulnerabili. I rischi maggiori sono legati alle captazioni e ai drenaggi per migliorare la qualità del pascolo. Piccoli frammenti si conservano anche in zone soggette a rimaneggiamenti (interruzioni derivanti dall'apertura di strade, piste forestali, altri manufatti) ma una torbiera basifila, se conservata integra, rappresenta un ambiente paesaggisticamente molto suggestivo anche per le pregevoli fioriture di orchidee.